

(地Ⅲ208)
平成26年2月7日

都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
小 森 貴

麻しん風しんの第2期の予防接種における
未接種者に対する積極的な勧奨等について

平成25年度の定期の予防接種（麻しん風しん第2期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）では、昨年4月1日から9月30日までの麻しんの第2期の接種率は、全国平均で59.1%でありました。

このことから、教育関係部局との連携を密にし、麻しん排除達成における指標である接種率95%に達するよう、未接種者に対する定期接種の接種勧奨等について、厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道府県衛生主管部（局）長および文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長宛別添の通知がなされました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知・協力方につきまして、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

健感発0206第2号
平成26年2月6日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長
（公 印 省 略 ）

麻疹風しんの第2期の予防接種における未接種者
に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記については、かねてから貴管内市区町村に対し、積極的な勧奨を行うよう指導いただき厚く御礼申し上げます。

さて、「平成25年度定期の予防接種（麻疹風しん第2期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添1のとおりとなっております。平成25年4月1日から9月30日までの麻疹の第2期予防接種実施状況の全国平均の接種率は59.1％でありました。

未接種者への接種勧奨の推奨に当たっては、別添2のとおり平成26年2月6日付け健感発0206第1号当職通知「麻疹風しんの第2期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」により、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長に対し、入学手続の機会等を利用して市町村が実施する定期予防接種の機会に関する周知及び教育関係部局における衛生関係部局との接種勧奨に係る連携に関する協力等を依頼したところです。

未接種者における接種の確実な実施を期するためには、未接種者に関する状況の把握及び当該者に対する接種機会等に関する情報提供を通じた積極的な勧奨が重要なため、教育関係部局との連携を密にし、麻疹に関する特定感染症予防指針に基づく排除達成の指標である接種率95％に到達するよう、引き続き接種勧奨に取り組まれるようお願い申し上げます。

○厚生労働省ホームページ

- ・麻疹・風しんについて（麻疹に関する特定感染症予防指針を含む）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou21/>

○国立感染症研究所ホームページ

- ・麻疹について

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html>

- ・風しんについて

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html>

総合表 都道府県別麻疹ワクチン接種率 2013年度中間評価 接種対象群別結果一覧

2013年4月1日～2013年9月30日

95%以上 90～95%未満 80～90%未満 70～80%未満 70%未満

No.	都道府県	第2期
合計		59.1
1	北海道	50.8
2	青森県	56.9
3	岩手県	61.1
4	宮城県	55.7
5	秋田県	64.4
6	山形県	61.2
7	福島県	59.6
8	茨城県	63.7
9	栃木県	64.2
10	群馬県	66.0
11	埼玉県	57.7
12	千葉県	61.7
13	東京都	58.2
14	神奈川県	50.6
15	新潟県	64.0
16	富山県	65.1
17	石川県	69.8
18	福井県	71.5
19	山梨県	60.8
20	長野県	67.8
21	岐阜県	58.7
22	静岡県	59.6
23	愛知県	67.8
24	三重県	65.3
25	滋賀県	66.8
26	京都府	59.9
27	大阪府	54.4
28	兵庫県	54.9
29	奈良県	58.9
30	和歌山県	68.9
31	鳥取県	58.2
32	島根県	68.4
33	岡山県	57.4
34	広島県	58.5
35	山口県	56.6
36	徳島県	64.3
37	香川県	66.1
38	愛媛県	57.7
39	高知県	52.7
40	福岡県	54.9
41	佐賀県	62.2
42	長崎県	60.4
43	熊本県	60.1
44	大分県	57.3
45	宮崎県	56.9
46	鹿児島県	61.7
47	沖縄県	60.3

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

総合表 都道府県別風しんワクチン接種率 2013年度中間評価 接種対象群別結果一覧

2013年4月1日～2013年9月30日

95%以上 90～95%未満 80～90%未満 70～80%未満 70%未満

No.	都道府県	第2期
合計		59.1
1	北海道	50.8
2	青森県	56.9
3	岩手県	61.1
4	宮城県	55.7
5	秋田県	64.4
6	山形県	61.2
7	福島県	59.6
8	茨城県	63.7
9	栃木県	64.2
10	群馬県	66.0
11	埼玉県	57.7
12	千葉県	61.7
13	東京都	58.2
14	神奈川県	50.6
15	新潟県	64.0
16	富山県	65.0
17	石川県	69.8
18	福井県	71.5
19	山梨県	60.8
20	長野県	67.8
21	岐阜県	58.7
22	静岡県	59.6
23	愛知県	67.8
24	三重県	65.3
25	滋賀県	66.8
26	京都府	59.9
27	大阪府	54.4
28	兵庫県	54.9
29	奈良県	58.9
30	和歌山県	68.9
31	鳥取県	58.2
32	島根県	68.4
33	岡山県	57.4
34	広島県	58.5
35	山口県	56.6
36	徳島県	64.3
37	香川県	66.1
38	愛媛県	57.7
39	高知県	52.7
40	福岡県	54.9
41	佐賀県	62.2
42	長崎県	60.4
43	熊本県	60.1
44	大分県	57.3
45	宮崎県	56.9
46	鹿児島県	61.7
47	沖縄県	60.3

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

表1-1 2013年度 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2014年1月27日現在、中間評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2013年4月1日現在の第2期対象者の数、②、③、④は2013年度における接種者の数

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2013年度 第2期
2013年4月1日～2013年9月30日

95%以上 90～95%未満 80～90%未満 70～80%未満 70%未満

第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人)：①	MRワクチン 接種者数(人)： ②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人)：④	麻しんワクチン 接種率(%) ：⑤ = (②+ ③) / ① × 100	風しんワクチン 接種率(%) ：⑥ = (②+ ④) / ① × 100
合計		1,100,137	650,548	41	27	59.1	59.1
1	福井県	7,273	5,199	0	0	71.5	71.5
2	石川県	10,493	7,326	0	0	69.8	69.8
3	和歌山県	7,985	5,503	0	0	68.9	68.9
4	島根県	5,920	4,047	0	0	68.4	68.4
5	長野県	18,885	12,807	0	0	67.8	67.8
	愛知県	70,431	47,744	5	0	67.8	67.8
7	滋賀県	14,117	9,431	1	1	66.8	66.8
8	香川県	8,767	5,793	0	0	66.1	66.1
9	群馬県	17,334	11,438	0	1	66.0	66.0
10	三重県	16,527	10,799	0	0	65.3	65.3
11	富山県	8,877	5,774	1	0	65.1	65.0
12	秋田県	7,448	4,793	0	0	64.4	64.4
13	徳島県	6,103	3,923	0	0	64.3	64.3
14	栃木県	17,556	11,269	0	0	64.2	64.2
15	新潟県	18,752	12,003	0	2	64.0	64.0
16	茨城県	25,265	16,099	1	1	63.7	63.7
17	佐賀県	7,950	4,941	0	0	62.2	62.2
18	千葉県	53,943	33,297	2	0	61.7	61.7
	鹿児島県	15,228	9,396	0	0	61.7	61.7
20	山形県	9,318	5,699	0	0	61.2	61.2
21	岩手県	10,478	6,397	0	0	61.1	61.1
22	山梨県	7,163	4,355	0	0	60.8	60.8
23	長崎県	12,134	7,323	0	0	60.4	60.4
24	沖縄県	16,865	10,163	0	0	60.3	60.3
25	熊本県	16,333	9,813	0	0	60.1	60.1
26	京都府	21,879	13,106	2	1	59.9	59.9
27	福島県	16,009	9,541	0	0	59.6	59.6
	静岡県	33,939	20,214	0	0	59.6	59.6
29	奈良県	11,762	6,927	0	0	58.9	58.9
30	岐阜県	18,580	10,909	1	1	58.7	58.7
31	広島県	25,881	15,134	1	1	58.5	58.5
32	東京都	103,175	60,021	7	2	58.2	58.2
	鳥取県	5,070	2,949	0	0	58.2	58.2
34	埼玉県	64,367	37,118	1	1	57.7	57.7
	愛媛県	12,074	6,970	0	0	57.7	57.7
36	岡山県	17,419	9,996	2	3	57.4	57.4
37	大分県	10,180	5,833	1	1	57.3	57.3
38	青森県	10,179	5,793	0	0	56.9	56.9
	宮崎県	10,520	5,982	0	0	56.9	56.9
40	山口県	11,789	6,674	0	0	56.6	56.6
41	宮城県	19,969	11,116	0	0	55.7	55.7
42	兵庫県	47,213	25,901	0	2	54.9	54.9
	福岡県	46,484	25,516	1	0	54.9	54.9
44	大阪府	76,187	41,425	8	1	54.4	54.4
45	高知県	5,722	3,013	0	0	52.7	52.7
46	北海道	41,225	20,951	4	4	50.8	50.8
47	神奈川県	79,369	40,127	3	5	50.6	50.6

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

表2 2013年度中間評価 都道府県別麻疹ワクチン接種率 伸び率の比較

伸び率が高い5都道府県

2012年9月末と2013年9月末の比較

No.	都道府県	第2期
合計		-1.4
1	北海道	0.7
2	青森県	-1.3
3	岩手県	-2.0
4	宮城県	-1.4
5	秋田県	-2.3
6	山形県	-1.7
7	福島県	-1.5
8	茨城県	-1.1
9	栃木県	2.2
10	群馬県	-0.4
11	埼玉県	-0.9
12	千葉県	-0.9
13	東京都	-1.9
14	神奈川県	-7.8
15	新潟県	-5.3
16	富山県	0.9
17	石川県	-2.9
18	福井県	0.8
19	山梨県	-2.4
20	長野県	1.4
21	岐阜県	-3.1
22	静岡県	3.0
23	愛知県	0.9
24	三重県	-2.0
25	滋賀県	1.9
26	京都府	0.2
27	大阪府	-0.9
28	兵庫県	-1.7
29	奈良県	-1.2
30	和歌山県	-0.4
31	鳥取県	-0.1
32	島根県	-1.3
33	岡山県	-4.7
34	広島県	-0.1
35	山口県	-2.7
36	徳島県	-3.0
37	香川県	-1.7
38	愛媛県	-1.8
39	高知県	9.2
40	福岡県	-2.2
41	佐賀県	-5.6
42	長崎県	-0.4
43	熊本県	0.7
44	大分県	-0.3
45	宮崎県	-1.1
46	鹿児島県	-0.8
47	沖縄県	-0.1

参考：2013年9月末

No.	都道府県	第2期
合計		59.1
1	北海道	50.8
2	青森県	56.9
3	岩手県	61.1
4	宮城県	55.7
5	秋田県	64.4
6	山形県	61.2
7	福島県	59.6
8	茨城県	63.7
9	栃木県	64.2
10	群馬県	66.0
11	埼玉県	57.7
12	千葉県	61.7
13	東京都	58.2
14	神奈川県	50.6
15	新潟県	64.0
16	富山県	65.1
17	石川県	69.8
18	福井県	71.5
19	山梨県	60.8
20	長野県	67.8
21	岐阜県	58.7
22	静岡県	59.6
23	愛知県	67.8
24	三重県	65.3
25	滋賀県	66.8
26	京都府	59.9
27	大阪府	54.4
28	兵庫県	54.9
29	奈良県	58.9
30	和歌山県	68.9
31	鳥取県	58.2
32	島根県	68.4
33	岡山県	57.4
34	広島県	58.5
35	山口県	56.6
36	徳島県	64.3
37	香川県	66.1
38	愛媛県	57.7
39	高知県	52.7
40	福岡県	54.9
41	佐賀県	62.2
42	長崎県	60.4
43	熊本県	60.1
44	大分県	57.3
45	宮崎県	56.9
46	鹿児島県	61.7
47	沖縄県	60.3

参考：2012年9月末

No.	都道府県	第2期
合計		60.5
1	北海道	50.1
2	青森県	58.2
3	岩手県	63.1
4	宮城県	57.1
5	秋田県	66.7
6	山形県	62.9
7	福島県	61.1
8	茨城県	64.8
9	栃木県	62.0
10	群馬県	66.4
11	埼玉県	58.6
12	千葉県	62.6
13	東京都	60.1
14	神奈川県	58.4
15	新潟県	69.3
16	富山県	64.2
17	石川県	72.7
18	福井県	70.7
19	山梨県	63.2
20	長野県	66.4
21	岐阜県	61.8
22	静岡県	56.6
23	愛知県	66.9
24	三重県	67.3
25	滋賀県	64.9
26	京都府	59.7
27	大阪府	55.3
28	兵庫県	56.6
29	奈良県	60.1
30	和歌山県	69.3
31	鳥取県	58.3
32	島根県	69.7
33	岡山県	62.1
34	広島県	58.6
35	山口県	59.3
36	徳島県	67.3
37	香川県	67.8
38	愛媛県	59.5
39	高知県	43.5
40	福岡県	57.1
41	佐賀県	67.8
42	長崎県	60.8
43	熊本県	59.4
44	大分県	57.6
45	宮崎県	58.0
46	鹿児島県	62.5
47	沖縄県	60.4

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入



健感発0206第1号
平成26年2月6日

文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長
(公 印 省 略)

麻疹風しんの第2期の予防接種における未接種者
に対する積極的な勧奨等について（依頼）

「平成25年度定期の予防接種（麻疹風しん第2期）の実施状況の調査結果（中間評価速報値）」については、別添のとおりとなっております。平成25年4月1日から9月30日までの麻疹の第2期予防接種実施状況の全国平均の接種率は59.1%でありました（平成24年の同時期は60.5%）。

各年度の麻疹風しんの定期予防接種の接種対象期限は3月31日までであり、麻疹に関する特定感染症予防指針に基づく排除達成の指標である接種率95%に到達するには、未接種者が残りの期間に確実に接種することが重要であるため、教育関係部局におかれましては、衛生関係部局と連携を密にいただき、麻疹風しんの第2期予防接種未接種・未罹患の者に対する接種期間に係る情報提供及び接種勧奨に御協力いただきますようお願い申し上げます。

また、未接種者に対する接種勧奨の推奨に当たり、平成26年度における小学校の入学手続きの機会等を利用して、平成25年度における定期接種の対象者（第2期：平成19年4月2日～平成20年4月1日の間に出生した者）に対し、市区町村が実施する定期予防接種を受ける機会があること、及び未接種の場合には入学前に接種を完了することが周知されるよう引き続き御協力をお願い申し上げます。

○厚生労働省ホームページ

- ・麻疹・風しんについて（麻疹に関する特定感染症予防指針を含む）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/>

○国立感染症研究所ホームページ

- ・麻疹について

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html>

- ・風しんについて

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html>